

1 инъекция 1 раз в 3 месяца

Резовива

ибандроновая кислота^{1,2}

Обеспечивает
эффективное лечение
постменопаузального
остеопороза и надежную
защиту от переломов
в дозе 3 мг внутривенно
1 раз в 3 месяца

- Ибандроновая кислота снижает риск новых переломов позвонков на 62% и риск внепозвоночных переломов на 69%³
- Ибандроновая кислота имеет удобный режим дозирования – 1 инъекция 1 раз в 3 месяца

1. Регистрационное удостоверение ЛП-005852

2. Информация для специалистов здравоохранения

3. Chesnut C.H. III, Skag A., Christiansen C. et al. Effects of oral ibandronate administered daily or intermittently on fracture risk in postmenopausal osteoporosis // J. Bone Miner. Res. 2004. Vol. 19. № 10. P. 1241–1249.

**Защитите пациентку
с постменопаузальным
остеопорозом от переломов
назначив ей ибандроновую кислоту
(РЕЗОВИВА)**




ОСТЕОСТАТИКС^{1,2}

золедроновая кислота 5 мг

СТАРТ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ

ОСТЕОПОРОЗА


ХРУП КРЕПКОСТЬ



- **НАДЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСТЕОПОРОЗА:**
высокая антирезорбтивная активность
- **УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ:**
1 инфузия в год

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Постменопаузальный остеопороз (для снижения риска переломов бедренной кости, позвонков и внепозвоночных переломов, для увеличения минеральной плотности кости)
- Профилактика последующих (новых) остеопоротических переломов у мужчин и женщин с переломами проксимального отдела бедренной кости
- Остеопороз у мужчин
- Профилактика и лечение остеопороза, вызванного применением глюкокортикостероидов
- Профилактика постменопаузального остеопороза (у пациенток с остеопенией)
- Костная болезнь Педжета



1 Регистрационное удостоверение №ЛП-005585
2 Информация для специалистов здравоохранения



Ф А Р М

С И Н Т Е З